



胃鏡檢查準備及藥物使用注意事項

1. 檢查前七天：

- 停用活絡血路之中西藥(魚油、銀杏、紅麴、人蔘、靈芝成分之保健品)。
- 如您有服用抗血小板、抗凝血劑、可能影響凝血之消炎止痛藥或等藥物，需依建議時間停藥(詳請見下表)；若未停藥，檢查當日將無法進行切片或息肉切除，以避免傷口出血之風險。
- 若有使用「腸泌素/瘦瘦針」控制血糖或體重，不論是針劑或口服藥，請於檢查前停用 1 次或 1 劑藥品。

2. 檢查前一天：

- 請於檢查前 8 小時完全禁食及禁水，直至檢查完成。

3. 檢查當日：

- 早上 5 點後禁止再喝任何水份及食品，且禁止服用降血糖劑及抗凝劑，如要服用其他慢性疾病藥物，可飲用少於 50cc 的白開水。
- 若因空腹過久造成低血糖症狀如冒冷汗，請先口含方糖或砂糖並於檢查當日主動告知醫護人員。

- 服用抗血小板、抗凝血劑或可能影響凝血的消炎止痛藥等以下藥物，需依建議時間停藥，請見下表：

藥名	檢查前停藥 (天)	藥名	檢查前停藥 (天)
Ticlopidine(Licodine/Panaldine)	10	Apixaban (Eliquis)	2
Aspirin(Tapal/Bokey)	7	Dabigatran (Pradaxa)	
Clopidogrel (Plavix)		Endoxaben (Lixian)	
Prasugrel (Effient)	5	Rivaroxaben (Xarelto)	
Warfarin (Coumadin)		Cilostazol(Pletaal/Citazol)	
Naproxen	4	Ibuprofen/Diclofenac /Ketoprofen/ketorolac	1
Ticagrelor (Brilinta)	3		
Dipyridamole(Persantin /Sandel)			
● 停藥天數計算方式： 健檢日(8/29)-停藥時間 7 天=需於 8/22 當天停藥 健檢日(8/29)-停藥時間 5 天=需於 8/24 停藥 ● 如有任何停藥相關問題，請您主動洽電: (02)2897-0011 轉 3225~3228			

小叮嚀：檢查當日若有進行切片或息肉切除，建議您一週內避免安排遠行或搭飛機